



Gastroscoopie/ERCP/EUS/PH/MANO

Richtlijnen voor medicijngebruik bij patiënten met diabetes
mellitus

Scopiecentrum / Maag Darm Lever

Informatie

Richtlijn medicijngebruik voor patiënten met diabetes mellitus die een endoscopie ondergaan.

Doel:

Binnenkort heeft u een afspraak voor een endoscopie. Tijdens de voorbereiding kunt u last krijgen van te hoge of te lage bloedglucosewaarden. Om deze problemen te voorkomen is het belangrijk dat u de op u van toepassing zijnde instructies in deze folder opvolgt.

Voorbereiding:

Naast de gebruikelijke voorbereiding die u voor het onderzoek moet treffen adviseren wij onderstaande richtlijn te hanteren.

Deze informatie heeft alleen betrekking op het gebruik op bloedglucoseverlagende medicatie bij diabetes mellitus, en niet op andere medicatie.

Volg de instructie in het (bijspuit)schema als u ondanks de juiste voorzorgsmaatregelen toch hypo-verschijnselen krijgt (zoals honger, beven, zweten, een trillerig gevoel, bleekheid, wazig zien, hoofdpijn en duizeligheid) of een bloedsuiker lager dan 4.0 mmol/l.

U doet er goed aan om druivensuikertabletten mee te nemen wanneer u voor onderzoek naar het ziekenhuis komt, dan heeft u toch iets bij de hand om een hypo te behandelen.

Tevens raden wij u aan om uw insulinepen, bloedsuikerapparaat (indien u die bezit) mee te nemen.

Gebruikt u behalve insuline ook bloedglucoseverlagende tabletten? Dan adviseren wij u zowel de richtlijn voor tabletten als de richtlijn van uw insuline schema te hanteren.

Richtlijn medicijngebruik voor patiënten met diabetes mellitus, die een endoscopie ondergaan.

Het betreft een richtlijn dus altijd bloedglucosewaarde in de gaten houden.

Medicatie		1 dag voor onderzoek	dag van onderzoek
Tabletten	Ja →	Geen wijzigingen, tabletten op de gebruikelijke tijd innemen.	→ Voor onderzoek geen tabletten. Bij 1e maaltijd na onderzoek, gebruikelijke dosering tabletten innemen. Medicatie hoeft niet ingehaald te worden.
Insuline 1x daags	Ja →	Indien u 's ochtends injecteert gebruikelijke dosering Indien u 's avonds injecteert 50% (1/2) van de gebruikelijke dosering	→ Indien u 's ochtends injecteert & onderzoek vóór 13.00 uur 's ochtends geen insuline. Bij eerste maaltijd na onderzoek 50% (1/2) van de gebruikelijke dosering Indien u 's ochtends injecteert & onderzoek ná 13.00 uur 50% (1/2) van de gebruikelijke dosering Indien u 's avonds injecteert gebruikelijke dosering

Richtlijn medicijngebruik voor patiënten met diabetes mellitus, die een gastroscopie ondergaan.

Medicatie		1 dag voor onderzoek	dag van het onderzoek.
Insuline 2 x daags	Ja →	Bij ontbijt gebruikelijke dosering Bij avondeten 75% (3/4) van de gebruikelijke dosering	Onderzoek vóór 13.00 uur 's ochtends geen insuline. Bij eerste maaltijd na onderzoek 33 % (1/3) van de gebruikelijke dosering 's avonds gebruikelijke dosering weer hervatten Onderzoek ná 13.00 uur Voor het ontbijt 33% (1/3) van de gebruikelijke dosering 's avonds gebruikelijke dosering weer hervatten

Richtlijn medicijngebruik voor patiënten met diabetes mellitus, die een gastroscopie ondergaan.

Medicatie	1 dag voor onderzoek	dag van onderzoek.
------------------	-----------------------------	---------------------------

Notities:

[illegible]

Locatie Enkhuizen

Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend

Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam

Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl



FLD-00085-NL 22-08-2023