



# Implantatie Insertable Loop Recorder (ILR)

Cardiologie

**Naam patiënt:** .....

De implantatie van een REVEAL DX of XT wordt verricht op de afdeling hartkatheterisatie van het **Dijklanderziekenhuis**, Maelsonstraat 3, 1624 NP Hoorn.

## **U kunt zich melden op .....dag om ..... uur bij de informatiebalie in de centrale hal van het Dijklander Ziekenhuis**

Voor deze ingreep moet u **nuchter** zijn; u mag dus niets eten of drinken vanaf 10.00 uur 's morgens.

### **Waarom wordt een ILR geïmplanteed?**

Met een ILR kan de oorzaak van bepaalde klachten die u heeft, gevonden worden. De klachten kunnen zijn: flauwvallen, licht gevoel in het hoofd, duizeligheid, hartkloppingen.

Een van de oorzaken kan een hartritmestoornis zijn. Met een ILR kan worden vastgesteld of een hartritmestoornis de oorzaak is van uw klachten.

Ook kan met een ILR worden bekeken of bepaalde medicijnen die u heeft gekregen helpen om uw klachten te verhelpen of te verminderen.

### **Hoe werkt de ILR?**

De ILR registreert uw hartactiviteit (hartritme). Wanneer u klachten heeft, kan aan de ILR de opdracht worden gegeven een beeld van het hartritme vast te leggen. Dit beeld (het ECG) wordt bekeken door de cardioloog. De cardioloog kan aan het ECG zien of uw hart te langzaam, te snel, onregelmatig of normaal klopt. Vervolgens kan de cardioloog beslissen wat de meest effectieve behandeling is voor u.

Dat opnemen of vastleggen van het hartritme bij klachten gebeurt met een los apparaatje, de Activator, die u meekrijgt.

### **De implantatie**

De implantatie van de ILR wordt uitgevoerd door één van de cardiologen samen met een arts-assistent en medewerkers van de katheterisatie kamer. De ingreep is

een eenvoudige ingreep en duurt ongeveer één uur.

De ILR is een klein apparaatje (kleiner dan een pakje kauwgom). Het apparaat wordt boven of onder in de borst onder de huid geplaatst. De plaats op de borst waar het apparaatje wordt ingebracht wordt verdoofd (vergelijkbaar met een verdoving bij de tandarts). Vervolgens wordt een klein sneetje in de huid gemaakt en het apparaatje wordt hier ingeschoven. De huid wordt vervolgens gehecht.

Als u terug bent op de verpleegafdeling moet u één uur bedrust houden, daarna mag u uit bed en ongeveer twee uur na de ingreep mag u naar huis.

## **De Activator**

Het gebruik van de Activator wordt u uitgelegd door de pacemakertechnicus.

De Activator is een apparaatje dat u meekrijgt. Hiermee activeert u de ILR om het hartritme op te slaan wanneer u klachten heeft. De Activator is gemakkelijk te bedienen met een knop op het apparaat. Wanneer u het hartritme vastlegt tijdens of vlak na de klachten blijft de registratie van het hartritme bewaard zodat de cardioloog precies kan zien wat er gebeurd is voor, tijdens en na uw klachten. Het is dus belangrijk om de Activator altijd bij u te dragen.

## **Nadat u de Activator gebruikt hebt**

Nadat u de Activator gebruikt hebt of nadat u bent flauwgevallen moet u contact opnemen met de pacemakertechnicus.

Dit kan tijdens kantooruren via telefoonnummer: 0229 208429

De pacemakertechnicus zal een afspraak met u maken om de opgeslagen gegevens van het hartritme, uit te lezen en op te slaan in uw medisch dossier. De opgeslagen gegevens worden vervolgens gewist uit het geheugen van de ILR.

Het is **belangrijk** dat u een afspraak maakt met de pacemakertechnicus om de gegevens die u heeft opgeslagen van het hartritme uit te lezen en om vervolgens het geheugen van de ILR weer leeg te maken, omdat het geheugen van de ILR beperkt is. Als u hiervoor geen afspraak maakt kan het zijn dat het geheugen vol raakt en u geen opnamen meer kunt maken wanneer u weer last krijgt.

**Gebruikt u: bloedverdunners, laxeermiddelen, plaspillen, insuline of andere medicijnen? Dan moet u de volgende 6 punten lezen:**

### **Bloedverduunners:**

1. Uw cardioloog bespreekt met u of u uw bloedverduunners moet stoppen en hoe lang van te voren.
2. Uw cardioloog spreekt met u af of u op de dag van uw behandeling bloed moet laten afnemen. U krijgt dan een lab-briefje van hem mee. U kunt uw bloed laten prikken op poli 7 vlak voordat u wordt opgenomen.
3. Heeft u een klepprothese dan bespreekt uw cardioloog met u wat het beleid is met het gebruik van de bloedverduunners want dan mag u de antistolling mogelijk niet stoppen.

### **Overige medicatie:**

1. Op de dag van de implantatie mag u geen **laxeermiddel** gebruiken.
2. Gebruikt u **plaspillen** (diuretica)? U kunt 's morgen wel u plaspil innemen.
3. Gebruikt u **andere medicijnen** dan hierboven beschreven? Deze kunt u gewoon innemen.
4. Gebruikt u **insuline**? U kunt uw insuline in de ochtend spuiten en gewoon ontbijten. Na 10.00 uur neemt u een halve dosering (indien van toepassing) met een beschuit of één snee brood en een kopje thee.

### **Voor iedere patiënt:**

Voor deze ingreep moet u **nuchter** zijn; u mag dus niets eten of drinken vanaf 10.00 uur 's morgens (tenzij u insuline gebruikt; zie hierboven bij punt 4).

Het is verstandig om een familielid of iemand anders mee te nemen tijdens deze dag.

Denkt u er aan om al uw medicijnen die u gebruikt mee te nemen?

### **Mocht u nog vragen hebben of bent u verhinderd?**

U kunt ons tijdens kantooruren bereiken via: 0229 208429

**Notities:**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





**Locatie Enkhuizen**

Molenweg 9b  
1601 SR Enkhuizen  
T. 0228 312 345

**Locatie Hoorn**

Maelsonstraat 3  
1624 NP Hoorn  
T. 0229 257 257

**Locatie Purmerend**

Waterlandlaan 250  
1441 RN Purmerend  
T. 0299 457 457

**Locatie Volendam**

Heideweg 1b  
1132 DA Volendam  
T. 0229 257 500

**Postbus 600, 1620 AR Hoorn**

[www.dijklander.nl](http://www.dijklander.nl)  
[info@dijklander.nl](mailto:info@dijklander.nl)



FLD-00215-NL 09-12-2020