



Implantatie van een hartritmemonitor (injectable)

Afdeling Cardiologie

Inleiding

U heeft de afgelopen tijd klachten gehad van duizeligheid, flauwvallen of hartkloppingen waarvan de oorzaak nog niet precies bekend is. Om uw hartritme over een langere tijd in de gaten te houden heeft uw behandelend arts u aangemeld voor een implanteerbare hartritmemonitor. Ook wel Implantable Loop Recorder (ILR) genaamd.

Wat is het doel van een implanteerbare hartritmemonitor?

Een implanteerbare hartritmemonitor is een apparaatje dat tijdelijk in uw lichaam zit. Met dit apparaatje wordt uw hartritme continu geregistreerd. Op deze manier kunnen mogelijke hartritmestoornissen opgespoord worden. Deze registratie wordt in het ziekenhuis door de cardiotechnicus uitgelezen en door de cardioloog geïnterpreteerd.

De hartmonitor

De hartmonitor is een apparaatje van ongeveer 4 cm bij 0.5 cm en wordt net onder de huid ingebracht, links naast het borstbeen.

De levensduur van de hartritmemonitor is ongeveer 3 jaar.

De activator

De activator is een draadloze afstandsbediening die de hartmonitor kan activeren. Dit apparaatje gebruikt u wanneer u klachten heeft.

Op het moment dat u klachten heeft drukt u op het knopje, zodat het hartritme geregistreerd en opgeslagen wordt. De cardioloog analyseert later de opgeslagen hartfilmpjes.

Als de voor u bekende klachten optreden doe dan het volgende:

- Leg de activator op de plaats waar de hartritmemonitor geïmplanteerd is (dit mag boven op uw kleding).
- Druk op de knop van de activator, er gaat vervolgens een lampje branden, waardoor u weet dat de handeling goed is uitgevoerd. Door het brandende lampje weet u dat de ritmestoornis ook is geregistreerd.

De oproep


U staat nu op een wachtlijst voor het implanteren van de hartritmemonitor. De wachttijd kan variëren, dit is afhankelijk van meerdere factoren. Zodra u aan de beurt bent wordt u door ons gebeld. U krijgt dan ook informatie over welke medicijnen u voor de behandeling wel of niet mag innemen.

De dag van de ingreep

Op de dag van de ingreep meldt u zich op de afdeling.....

U wordt daar ontvangen en voorbereid. Wanneer u aan de beurt bent wordt u naar de behandelkamer gebracht.

Voor aanvang van de ingreep zal de cardiotechnicus bepalen waar bij u de hartritmemonitor het beste geplaatst kan worden. U kunt op dat moment nog vragen stellen. Op het plaatje hiernaast kunt u zien waar de hartritmemonitor ongeveer geplaatst wordt.



De ingreep

In de behandelkamer gaat u liggen op een behandeltafel. U krijgt een steriel laken over u heen en het operatiegebied wordt plaatselijk verdoofd. In de huid wordt een klein sneetje gemaakt. Vervolgens wordt de hartritmemonitor onder de huid geschoven. Daarna wordt de wond gesloten. Tijdens de implantatie kunt u gewoon met het behandelteam praten en aangeven hoe u zich voelt.

Na de ingreep

Als de hartritmemonitor geplaatst is komt de cardiotechnicus weer bij u om de hartritmemonitor aan te zetten en in te stellen. Dit gebeurt door middel van een programmeerkop die op de plek gelegd wordt waar de hartritmemonitor geïmplant is. U ontvangt de activator en krijgt uitleg over de werking hiervan. Daarna mag u zich aankleden.

U mag vervolgens op een stoel plaatsnemen en even tot rust komen. Als u zich goed genoeg voelt mag u naar huis.

Leg vrienden en familie uit wat een hartritmemonitor is en hoe de activator (afstandsbediening) functioneert.

De eerste controleafspraak is na twee à drie weken bij de cardiotechnicus op de polikliniek Cardiologie.

Weer thuis

U kunt eerst nog wat pijn ervaren op de plaats waar de hartritmemonitor is geplaatst. Hiervoor mag u de voorgeschreven pijnstillers gebruiken.

Drie dagen na de ingreep mag u zelf de pleister verwijderen. Het wondje moet volledig dicht en droog zijn. U mag het wondje afspoelen met water, maar gebruik geen zeep op en rondom het wondje en dep het zachtjes droog.

Complicaties en risico's rondom de hartritmemonitor implantatie

Er bestaat een zeer kleine kans er complicaties optreden.

Mogelijke complicaties zijn:

- Bloeding/nabloeding: er kan een bloeduitstorting ontstaan doordat er onder de huid enkele bloedvaatjes geraakt worden tijdens de implantatie. De bloeduitstorting verdwijnt na enkele dagen meestal vanzelf.
- Infectie: de behandeling wordt steriel uitgevoerd, maar toch is er is een kleine kans op infectie van de wond. De huid rond de wond ziet dan rood en is warm. U kunt koorts en toenemende pijn aan de wond krijgen.

Als dit gebeurt neemt u dan, tijdens kantooruren, contact op met polikliniek cardiologie Purmerend via telefoonnummer 0299 457146, of de polikliniek cardiologie Hoorn via telefoonnummer 0229 257219.

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de huisartsenpost.

Vragen?

Met vragen of voor meer informatie kunt u op kantoordagen tussen 8,30 en 17.00 uur contact opnemen met de polikliniek Cardiologie Purmerend via telefoonnummer 0299 457146, of de polikliniek cardiologie Hoorn via telefoonnummer 0229 257219.

Notities:

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Locatie Enkhuizen

Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend

Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam

Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl



WLZ-25918-NL 22 augustus 2022