

Laserbehandeling
subretinale neovascularisatie
Polikliniek Oogheelkunde

U wordt behandeld met laser vanwege subretinale neovascularisatie.

Subretinale neovascularisatie is een moeilijk woord voor: “groei van bloedvaatjes onder het netvlies”. Deze bloedvaatjes groeien als een fijn netwerkje, dat langzaam groter wordt. Het is niet goed bekend, waarom de bloedvaatjes verschijnen, maar wel dat ze veel kwaad kunnen aanrichten. Ze zijn namelijk abnormaal gevormd, waardoor ze heel makkelijk bloeden en ook vocht lekken, dat zich ophoopt in en onder het netvlies. Hierdoor ontstaat vervorming van het beeld en ook vaak minder goed kunnen zien. Vaak leidt dit tot onherstelbaar verlies van het gezichtsvermogen. Vroeg of laat stopt de groei echter en verandert het netwerkje in een litteken. Het is dus niet zo, dat het gezichtsvermogen geheel verloren gaat. Helaas is het wel zo, dat de bloedvaatjes de sterke neiging hebben naar het meest gevoelige centrale deel van het netvlies, de macula, te groeien.

Wat doet de laser?

De laser schroeit de bloedvaatjes dicht en probeert zo de groei van het netwerkje te stoppen. Hierdoor ontstaat echter wel een litteken op de plaats van de brandplek en daardoor een permanente vlek in het centrale deel van het gezichtsveld. Het idee is, dat je beter een klein stukje kunt “opofferen” om te voorkomen dat het centrum helemaal verloren gaat. We laseren echter alleen, als er voldoende ruimte is om het netwerkje uit te schakelen zonder het meeste gevoelige centrum te beschadigen. Het is echter wel zaak het plekje **geheel** dicht te schroeien, omdat een klein restant zeker weer opnieuw zal uitgroeien.

Hoe groot is de kans op genezing?

Dat is in het algemeen moeilijk in te schatten. Er zijn verschillende factoren van invloed: hoe ver het plekje van het centrum verwijderd is, hoe groot het is, of het duidelijk afgrensbaar is van de omgeving, of u jong of oud bent, of u bijziend bent of niet, of er bloed langs de rand van het plekje zit enzovoort. De eerste maanden zijn het spannendst: dan zal blijken of de behandeling geslaagd is of niet. Na ongeveer twee tot drie weken worden eventueel opnieuw foto's met fluoresceïne (kleurstof) gemaakt om te zien of het plekje goed verlittekend is en of de vaatjes allemaal uitgeschakeld zijn. Als dit goed is, wordt verder afgewacht; anders zal geprobeerd

worden nogmaals te laseren. Echter, ook als de behandeling geslaagd lijkt, kan het probleem na korte of langere tijd terugkomen. Het blijft belangrijk bij verandering van uw gezichtsvermogen (meer vervorming, slechter zien) te bellen en op zeer korte termijn een afspraak te maken voor oogheelkundige controle.

Adviezen

Het is belangrijk te trachten een bloeding uit het nu nog verse laserlitteken te voorkomen. Probeert u daarom persen en druk op het hoofd (zwaar tillen, bukken, opdrukken etc.) te voorkomen. Gebruikt u ook liever geen aspirine in deze periode (paracetamol is geen bezwaar). Mocht u Ascal gebruiken op dokstersvoorschrift, dan moet u daar wel mee doorgaan. Eventuele oogdruppels, die u al voor de laserbehandeling gebruikte, moet u gewoon blijven gebruiken.

Locatie Enkhuizen

Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend

Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam

Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl



FLD-00680-NL 08-11-2021