

Levemir

Is een heldere ultralangwerkende insuline.

Werking

Na injectie zal de werking van Levemir binnen 1 tot 1,5 uur intreden. Levemir heeft een stabiele werking, het werkt langzaam en gelijkmatig. De totale werkingsduur is 22 tot 24 uur, afhankelijk van de dosering.

Waar

Levemir wordt in het onderhuidse vetweefsel toegediend van het bovenbeen. De opname in het bovenbeen is langzamer dan op andere plaatsen. Indien het niet mogelijk is om in het bovenbeen te injecteren dan kan de insuline ook in de buik worden geïnjecteerd. Houdt de naald na de injectie tenminste 10 seconden onder de huid, zodat u zeker weet dat de volledige dosis is geïnjecteerd. Wissel de injectieplaats goed af, zodat de huid kan herstellen van de injectie en defecten kunnen worden voorkomen.

Gebruikt u naast de Levemir ook een snelwerkende insuline en injecteert u in hetzelfde gebied, houdt dan afstand van zeker 2 cm tussen 2 injecties.

Wanneer

Voor een juiste werking is het noodzakelijk elke dag de insuline op een zelfde tijdstip toe te dienen, bij voorkeur in de avond. Deze insuline hoeft niet gekoppeld te worden aan een maaltijd.

Houdbaarheid

Levemir is buiten de koelkast 6 weken houdbaar bij een maximum temperatuur van 30 graden.

De voorraad insuline bewaren in de koelkast tot vervaldatum.

Bescherm tegen bevriezing, extreme hitte en zonlicht.