



# Mesalazine

Interne geneeskunde

Locatie Hoorn/Enkhuizen

# Mesalazine

## Inleiding

De maag-darm-leverarts (MDL-arts) heeft samen met u besloten om u te behandelen met mesalazine. In deze informatiefolder krijgt u nadere informatie over dit medicijn.

## Mesalazine

Mesalazine (b.v. Asacol, Mezavant, Pentasa, Salofalk) remt de ontsteking. Het kan even duren voor u het effect bemerkt. Als het middel goed uitpakt kunt u het jarenlang blijven gebruiken. Afhankelijk van de plaats van ontsteking kiest de arts voor tabletten/korrels/klysmata/schuim/zetpillen of een combinatie hiervan.

## Gebruik

### *Tabletten en granulaat*

- Heel doorslikken met een half glas water, niet kauwen.
- Pentasa-korrels kunnen vooraf op wat voedsel gestrooid worden, b.v. yoghurt.
- Pentasa-tabletten kunt u vooraf in een paar minuten in vloeistof uiteen laten vallen. Let op dat u alle “korreltjes” inneemt en dat u er niet op kauwt.

### *Zetpillen*

- Zorg ervoor dat uw endeldarm leeg is voordat u de zetpil inbrengt.
- Breng de zetpil in de anus. Het maakt niet uit of u de zetpil met de punt naar voren of met de stompe kant naar voren inbrengt. Als u de zetpil met een beetje water bevochtigt, kunt u hem wat makkelijker inbrengen.
- Als u de zetpil binnen 10 minuten verliest, kunt u een nieuwe inbrengen.

### *Klysmata*

- Laat de klysmata op lichaamstemperatuur komen, b.v. in een lauwwarm waterbadje.
- Ga op de linkerzij liggen. Houd uw onderste been gestrekt en het bovenste gebogen.
- Schud de klysmata goed. Breng de tuit van de klysmata voorzichtig in de anus [tuit insmeren met vaseline]
- Knijp de fles zo veel mogelijk leeg en trek deze weer uit de anus. Houd de fles ingedrukt als u hem terugtrekt. Er blijft altijd een beetje vloeistof achter in de

verpakking.

- Rol op uw buik en blij ongeveer vijf minuten zo liggen om te voorkomen dat de vloeistof er weer uit komt.
- Houd er rekening mee dat wanneer u vloeistof knoeit, of als de vloeistof wegloopt, dit bruine vlekken veroorzaakt in linnengoed. Deze vlekken zijn er niet meer uit te wassen. Gebruik dus een absorberend matje.

## **Bijwerkingen**

De volgende bijwerkingen kunnen ontstaan door het gebruik van mesalazine:

- Bij klysma en zetpillen: prikkelend gevoel in de anus.
- Maag- of darmklachten, zoals braken, diarree, buikpijn of misselijkheid. Advies: neem het medicijn tijdens of net na de maaltijd.
- Hoofdpijn.
- Stemningsveranderingen.
- Overgevoeligheidsreacties (huiduitslag, jeuk, netelroos, koorts).

Neem direct contact op met uw MDL arts/ MDL verpleegkundige bij

- Huiduitslag.
- Ontsteking van het mondslijmvlies.

## **Zwangerschap en borstvoeding**

In een dosering tot twee gram per dag kunt u dit medicijn gebruiken. Overleg met uw arts als u een hogere dosering moet gebruiken.

Mesalazine gaat in geringe mate over in de moedermelk. Overleg met uw arts.

## **Bloedonderzoek:**

Om eventuele bijwerkingen op nierfunctie vroegtijdig te ontdekken is regelmatig onderzoek nodig.

## **Tot slot**

Als u nog vragen heeft dan kunt u telefonisch contact opnemen met de MDL-verpleegkundige: Gerda Slootweg, tel. 0229-208083; donderdag en vrijdag van 13.00 tot 14.00 uur.

U kunt ook mailen naar de MDL-verpleegkundige:

[g.slootweg-vandijk@westfriesgasthuis.nl](mailto:g.slootweg-vandijk@westfriesgasthuis.nl)

Uw mail wordt zo spoedig mogelijk beantwoord.







**Locatie Enkhuizen**

Molenweg 9b  
1601 SR Enkhuizen  
T. 0228 312 345

**Locatie Hoorn**

Maelsonstraat 3  
1624 NP Hoorn  
T. 0229 257 257

**Locatie Purmerend**

Waterlandlaan 250  
1441 RN Purmerend  
T. 0299 457 457

**Locatie Volendam**

Heideweg 1b  
1132 DA Volendam  
T. 0229 257 500

**Postbus 600, 1620 AR Hoorn**

[www.dijklander.nl](http://www.dijklander.nl)  
[info@dijklander.nl](mailto:info@dijklander.nl)



FLD-00099-NL 09-12-2020