

Inspuiten van antibioticum in dialysaatzakken

Tijdens een buikvliesontsteking kan het voorkomen dat u zelf het antibioticum in de dialysaatzakken moet spuiten.

Het inspuiten in de dialysaatzak leert u van de PD-verpleegkundige.

De spuitjes krijgt u kant en klaar mee van de Maelsonapotheek. Dit regelt de PD-verpleegkundige.

De spuitjes zijn lang houdbaar, omdat ze op een speciale manier zijn klaargemaakt. De spuitjes moeten in de koelkast worden bewaart.

Benodigdheden:

- Kant en klaar antibioticumspuitje: hier zit een rood dopje op. Controleer de juiste dosering en de houdbaarheidsdatum
- Inspuitnaald: subcutane naald
- Flesje alcohol 70%
- Gaasjes 5 x 5 cm.
- Handen alcohol
- Verwarmde (nacht)zak volgens schema: Physioneal40 of extraneal
- Naaldencontainer: te halen bij uw eigen apotheek

Uitvoering:

- Maak het werkblad schoon zoals u is geleerd.
- Pak het antibioticumspuitje uit de koelkast.
- Leg de materialen voor de CAPD wisseling, het antibioticumspuitje en de inspuitnaald op het schone werkblad.
- Desinfecteer de handen met handen alcohol.
- Open de verpakking van de inspuitnaald: laat de naald erin liggen.
- Draai het rode dopje van het antibioticumspuitje. Raak hierbij de opening van het spuitje niet aan.
- Zet de naald op het spuitje: raak hierbij het opzetstukje/opening van het spuitje en de naald niet aan.
- Laat het plastic hulsje op de naald totdat u gaat inspuiten.
- Verwijder de buitenverpakking van de warme dialysaatzak.
- **Physioneal40: breek het groene piefje tussen de beide 2 vloeistoffen nog niet.**
- Desinfecteer de handen met handen alcohol.
- Desinfecteer het rubberen aanprikpunt van de dialysaatzak met een gaasje met alcohol: laat dit 30 sec. inwerken.
- Plaats het antibioticumspuitje in het midden van het aanprikpunt van de dialysaatzak en spuit het antibioticumspuitje leeg.
- Trek na inspuiting van het antibioticum nog wat dialysaat op en spuit dit weer terug; er mag geen antibioticum achterblijven in het aanprikpunt.
- Verwijder het spuitje uit het aanprikpunt.
- Deponeer de naald in de naaldencontainer **zonder** het hulsje (zet dus niet het hulsje terug op de naald: prikgevaar!).
- Schudt de zak hierna zachtjes heen weer (vooral bij het aanprikpunt) zodat het antibioticum goed verdeeld wordt in het dialysaat.
- **Physioneal40:** hang de dialysaatzak op de infuuspaal en breek het groen piefje, zodat de vloeistoffen zich mengen. Knijp daarna zachtjes in de zak zodat het geheel zich mengt.

- Doe de CAPD wisseling volgens het trainingsboekje. Denk aan handenhygiëne.

NB:

- Let op overgevoeligheidsreacties op het antibioticum.
- Wanneer u de naald door de buitenwand van het aanprikpunt hebt geprikt pakt u een andere dialysaatzak en een ander antibioticumsputje en inspuitnaald en begint u opnieuw.

Aandachtspunt voor de thuiszorg/externe instelling:

De antibioticumsputjes en inspuitnaalden worden door de PD verpleegkundige besteld op recept.