



Zelfinjectie

(therapie bij impotentie)

Urologie

Zelfinjectie therapie bij impotentie

U hebt samen met de uroloog besproken dat u wilt starten met het leren zelfinjecteren van Androskat. Zoals besproken is met de uroloog is dit een middel om een erectie te verkrijgen.

Hierbij injecteert u zelf een medicijn in het zwellichaam van uw penis. Dit zorgt voor een verwijding van de bloedvaten en een verslapping van de spieren in het zwellichaam, zodat er meer bloed in de penis zal stromen en u een erectie kunt krijgen.

Dit medicijn zal de zin in seks echter niet verhogen.

Bij de juiste dosering werkt het middel vrijwel onmiddellijk. De duur van de erectie is afhankelijk van de dosis en de oorzaak van de erectieproblemen.

Hoe verkrijgt u het medicijn Androskat?

Van de uroloog krijgt u een recept mee waarmee u naar de apotheek kunt gaan om de Androskat te halen. Samen met het medicijn krijgt u ook een doosje (kit) mee met de benodigdheden voor het injecteren en een naaldencontainer.

Het medicijn Androskat wordt niet vergoed. Daarom wordt er meestal maar een recept uitgeschreven voor één doosje van vijf stuks Androskat.

Van de apotheek krijgt u een folder mee waarin de werking en toediening van het medicijn uitgelegd wordt. Wij adviseren u dit goed door te lezen alvorens u de afspraak heeft met de continentieverpleegkundige op de polikliniek urologie.

Uitleg en instructie door de continentieverpleegkundige

U krijgt een afspraak bij de continentieverpleegkundige in het spreekuur op de polikliniek.

Dan neemt u het medicijn Androskat en de kit mee naar de afspraak.

Samen neemt u alle handelingen door waarna de continëntieverpleegkundige de eerste injectie gaat geven met een kleine, door de uroloog afgesproken, opstartdosis.

Vervolgens krijgt u adviezen om hier op de juiste wijze mee om te gaan.

In een tweede afspraak bespreken we de ervaring en effect van de eerste injectie en passen zonodig de dosis aan. Daarna is het de bedoeling dat u zelf gaat injecteren onder begeleiding. U dient dan de materialen weer mee te nemen.

Nazorg

Een injectie kan in enkele gevallen leiden tot erecties die langer duren dan wenselijk. Als de injectie langer aanhoudt dan een uur moet u gaan koelen met ijskoude kompressen.

Wanneer moet u contact opnemen met het ziekenhuis?

Wanneer een erectie langer dan vier uur aanhoudt **nadat u hebt gekoeld**, neem dan contact op met het ziekenhuis.

Tot slot

Deze brochure betreft een algemene voorlichting. Bijzondere omstandigheden kunnen aanleiding tot wijzigingen geven. Dit zal altijd door uw behandelend uroloog aan u kenbaar gemaakt worden. Als er bijzonderheden zijn waar u zich zorgen over maakt of nog vragen resteren, neemt u dan contact op met de polikliniek urologie

Locatie Purmerend: (0299)457139

Bij klachten en acute problemen s 'avonds en in het weekend dan graag contact opnemen met de spoedeisende hulp (0299)457457

Locatie Hoorn: (0229)257826

Bij klachten en acute problemen s 'avonds en in het weekend dan graag contact opnemen met de spoedeisende hulp (0229)257257

Locatie Enkhuizen

Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345

Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257

Locatie Purmerend

Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam

Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn

www.dijklander.nl
info@dijklander.nl



FLD-00937-NL 10-12-2020